

【胃がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
CapeOX	3週間	中等度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服
SOX	3週間	中等度	d1夕～d15朝 エスワン 内服
[SH]Tmab+CDDP[+Cape併用]	3週間	高度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服 (HER2陽性限定)
[SH]CDDP[+Cape併用]	3週間	高度	d1夕～d15朝 カペシタビン内服
[SH]CDDP[+S-1併用]	5週間	高度	d1夕～d15朝 エスワン 内服
RAM+PTX	4週間	軽度	
RAM単剤療法	4週間	軽度	
Nivolumab単剤療法	2週間	最小	3rdine以降
CPT-11+CDDP	4週間	高度	アプレヒタントd1～d3内服
CPT-11+CDDP(CDDP分割)	4週間	高度	アプレヒタントd1～d3内服
DTX単剤療法	3週間	軽度	
LowdoseFP I	4週間	高度	
LowdoseFP II	4週間	軽度	
mFOLFOX6	2週間	中等度	
PTX[+S-1併用]	3週間	軽度	d1夕～d15朝 エスワン 内服
biweeklyPTX単剤療法	4週間	軽度	
weeklyPTX単剤療法	4週間	軽度	
biweeklyCPT-11単剤療法	2週間	中等度	
weeklyCPT-11単剤療法	4週間	中等度	